

1. バイアルには Medikation Error Prevention のために灰色の円筒状の筒（オーバーキャップ）が被せてあります。このオーバーキャップ及びフリップオフキャップ（プラキャップ）は、バイアルの胴体を片方の手で持ち、もう片方の手でオーバーキャップの側面から斜め上方向に押し上げるようにすると容易に外れます。



製品はバイアル製剤にオーバーキャップを被せたものになっています

オーバーキャップを外します

プルトップが現れます

注) オーバーキャップの爪がバイアルのプラキャップを引っかけて外れる仕組みです

2. キャップを取り外したバイアル上面にはリング状のプルトップがついており (①)、このリングを引くことで金具が外れ (②)、ゴム栓を手で開けることができます。



3. ゴム栓を手で取り外し、バイアル内に水を注ぎます。溶解時の水の量はバイアルの中ほど～肩口程度までを目安としてください（概ね 5～10mL）。

4. ゴム栓を再び取り付けて、上面を抑えて振り混ぜれば 30 秒前後で溶解します。



5. 1 回分飲み切りの場合はバイアルからそのまま服用いただけます。分割して服用する場合には、バイアル内の溶解液の必要量を別容器に移し、単シロップなどを加えることも可能です。残りを保存する場合にはゴム栓をして冷蔵庫内に保管し、溶解してから 24 時間以内に服用してください。