



シクレストを使用される方へ

シクレストは、**1日2回、舌の下**で溶かして使用するお薬です。

1 色のついた裏面のシートをはがしてください。



2 つぶさないように、ゆっくりお薬を取り出してください。



3 取り出したお薬をすぐに舌の下に入れてください。



※唾液は普段通り飲みこめます。
お薬が欠けていたり、割れていた場合も、全量を舌の下に入れてください。

気をつけていただきたいこと

お薬が吸収されて、効果を発揮するために大切なこと

- 吸湿性が高いので、かわいた手で取りあつかってください。
- 水なしで服用し、**飲食は10分間避けてください。**
このお薬は舌の下の口腔粘膜から吸収されます。
- **口の中にしびれ感や苦味**があらわれることがあります。
この症状は通常1時間以内になくなります。
※唾液は普段通り飲みこめます。
- **一緒に飲むお薬がある場合、最後にシクレストを使用**しましょう。

* お薬が欠けていたり割れていた場合も、全量を舌の下に入れてください。



保管

- 湿気をさけて保管してください。
- シートから取り出さずに保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

次のような症状があらわれることがあります

眠気



口の中の
しびれ感



足がむずむずする、
じっと座って
いられない



筋肉のこわばり、
手足のふるえ、
動きが遅い



体重が
増える、
減る



めまい、
立ちくらみ、
転倒



特に気をつけていただきたい症状

- 急な発熱、筋肉のこわばり、手足のふるえ
- 口をとがらせたり、引っ込めたり、舌を出す
- じんましん、眼や唇のまわりのはれ、息苦しい
- 口が渇く、水を多く飲む、尿の量や回数が多い
- 手足のしびれ・痛み、筋肉痛、脱力感、褐色の尿
- 突然の高熱、さむけ、のどの痛み
- 舌や咽頭のはれ

このような症状があらわれたり、
何かいつもと違う症状があらわれたら、
できるだけ早めに主治医や看護師、
薬剤師の先生にご相談ください。



Meiji Seika ファルマ株式会社
東京都中央区京橋 2 - 4 - 16
<https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/>