

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」を服用される患者様へ 服用前によくお読みください


様

このお薬は

1回 バイアルを、


1日 回

服用してください。



お薬の飲み方

1 ピンクのふたを取ります。
アルミのリングを立て、下に
引っ張り取り除きます(右図)。
中のゴム栓も外します。



2 左の図の1/4バイアル~1/2バイアル
まで水を入れ、ゴム栓をして軽く
振って粉を溶かします。左の図の
1/バイアルまで水やシロップを入れ、
ゴム栓をしてよく混ぜます。



3 左に書かれた用法・用量
を守ってお飲みください。
カップに移す、スポイトを使うな
ど測りやすい方法で必要量を
取ります。



1日分を1度に作る場合は、ゴム栓をして冷蔵庫で保管してください。
(溶かしたら、24時間以内に服用してください)

ご注意



- 気になること、ご不明な点がある方は、
医師または薬剤師にご相談ください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の
判断で飲むのをやめないでください。

Meiji Seika ファルマ株式会社

VCNP000301©
(GT)
作成：2021.3
03M-23Y

バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」を服用される患者様へ 服用前によくお読みください


様

このお薬は

1回 バイアルを、


1日 回

服用してください。



お薬の飲み方


1 ピンクのふたを取ります。
アルミのリングを立て、下に
引っ張り取り除きます(右図)。
中のゴム栓も外します。



2 左の図の1/4バイアル~1/2バイアル
まで水を入れ、ゴム栓をして軽く
振って粉を溶かします。左の図の
1/バイアルまで水やシロップを入れ、
ゴム栓をしてよく混ぜます。



3 左に書かれた用法・用量
を守ってお飲みください。
カップに移す、スポイトを使うな
ど測りやすい方法で必要量を
取ります。



1日分を1度に作る場合は、ゴム栓をして冷蔵庫で保管してください。
(溶かしたら、24時間以内に服用してください)

ご注意



- 気になること、ご不明な点がある方は、
医師または薬剤師にご相談ください。
- 医師または薬剤師の指示なしに、自分の
判断で飲むのをやめないでください。

Meiji Seika ファルマ株式会社

VCNP000301©
(GT)
作成：2021.3
03M-23Y